

TABELLA DESCRITTIVA DEI PRINCIPALI SINTOMI CORRELATI AI DIVERSI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE ALCOLEMICA

(Art.6 del decreto-legge 3 agosto 2007 n.117 convertito in legge, con modificazioni, dall' art.1 della legge 2 ottobre 2007, n.160)

LIMITE LEGALE DEL TASSO ALCOLEMICO PER LA GUIDA: 0,5 GRAMMI per LITRO

CONCENTRAZIONE DI ALCOL NEL SANGUE (G/L)	SENSAZIONI PIÙ FREQUENTI (*)	EFFETTI PROGRESSIVI E ABILITÀ COMPROMESSE (*)
0	Nessuna	Nessuna
0,1 - 0,2	• Iniziale sensazione di ebbrezza. • Iniziale riduzione delle inibizioni e del controllo.	• Affievolimento della vigilanza, attenzione e controllo. • Iniziale riduzione del coordinamento motorio. • Iniziale riduzione della visione laterale. • Nausea.
0,3 - 0,4	• Sensazione di ebbrezza. • Riduzione delle inibizioni, del controllo e della percezione del rischio.	• Riduzione delle capacità di vigilanza, attenzione e controllo. • Riduzione del coordinamento motorio e dei riflessi. • Riduzione della visione laterale. • Vomito.

0,5 G/L : LIMITE LEGALE DEL TASSO ALCOLEMICO PER LA GUIDA

0,5 - 0,8	• Cambiamenti dell'umore. • Nausea, sonnolenza. • Stato di eccitazione emotiva.	• Riduzione della capacità di giudizio. • Riduzione della capacità di individuare oggetti in movimento e della visione laterale. • Riflessi alterati. • Alterazione della capacità di reazione agli stimoli sonori e luminosi. • Vomito.
0,9 - 1,5	• Alterazione dell'umore. • Rabbia. • Tristezza. • Confusione mentale, disorientamento.	• Compromissione della capacità di giudizio e di autocontrollo. • Comportamenti socialmente inadeguati. • Linguaggio mal articolato. • Alterazione dell'equilibrio. • Compromissione della visione, della percezione di forme, colori, dimensioni. • Vomito.
1,6 - 3,0	• Stordimento. • Aggressività. • Stato depressivo. • Apatia. • Letargia.	• Compromissione grave dello stato psicofisico. • Comportamenti aggressivi e violenti. • Difficoltà marcata a stare in piedi o camminare. • Stato di inerzia generale. • Ipotermia. • Vomito.
3,1 - 4,0	• Stato di incoscienza.	• Allucinazioni. • Cessazione dei riflessi. • Incontinenza. • Vomito. • Coma con possibilità di morte per soffocamento da vomito.
Oltre 4	• Difficoltà di respiro, sensazione di soffocamento. • Sensazione di morire.	• Battito cardiaco rallentato. • Fame d'aria. • Coma. • Morte per arresto respiratorio.

Fonte: riadattato dal testo dell'Advisory Committee and NIAAA scientists, 2003

(*) A parità di quantità di alcol assunto, sensazioni ed effetti sono estremamente variabili da soggetto a soggetto, con possibilità di manifestazioni anche opposte tra di loro; in tabella sono riportati sensazioni ed effetti più frequentemente rilevati.

